

Système des styli motorii. — Tête. 7 paires de styles dont une, isolée, située en avant du milieu du rostre, deux autres vers la base du rostre et une quatrième à son origine même; deux paires orbitales et une paire post-frontale.

Pronotum. 2 paires au bord antérieur; de chaque côté, 3 styles marginaux; postérieurement, une rangée de 3 paires de styles avant la base. Une paire discoïdale.

Mésnotum et métanotum. De chaque côté, deux styles rapprochés.

Les tergites abdominaux 1-5 présentent de chaque côté 3 styles, dont 2 discoïdaux, rapprochés, et un latéral, marginal. Sur les tergites 6 et 7, le même nombre de styles existe, mais ces styles sont rapprochés du bord postérieur. Le segment 8 n'a que deux styles dorsaux discoïdaux. En outre, la face ventrale de chacun des deux derniers segments abdominaux porte un petit style de chaque côté.

Chaque podothèque est munie de deux styles rapprochés, dans la région fémorale apicale.

Stigmates peu apparents, situés aux flancs des segments abdominaux, au-dessous de la saillie stylifère latérale du tergum de chaque segment.

CATALOGUE DES ESPÈCES DE PHYMATIDÆ (HÉMIPTÈRES HÉTÉR.)
DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR M. J. MARTIN.

Toutes les espèces qui suivent ayant contribué à établir l'importante monographie de M. A. Handlirsch, nous croyons utile d'en donner la liste alphabétique.

KNIZOCORIS DAVIDI Handlirsch (*Ann. des K. K. natur. Hofmuseums Wien*, Bd. XII, II, 1897, p. 214). — Type: Moupin (Thibet) (David, 1870).

KNIZOCORIS STENOCEPHALUS Handlirsch (*loc. cit.*, p. 214). — Type: Dardjiling (Harmand, 1886).

GLOSSOPELTA HARMANDI Handlirsch (*loc. cit.*, p. 217). — Type: Mont. de Chaudoc (Cochinchine) (Harmand, 1877).

MACROCEPHALUS AFFINIS Guérin. — Rio-Janeiro (d'Orbigny, 1834); capitainerie des Mines; Brésil (Mauger, 1853).

MACROCEPHALUS CRASSUS Handlirsch (*loc. cit.*, p. 191). — Type: Brésil (coll. G. Fallou).

MACROCEPHALUS LEPIDUS Stål. Mexique (A. Sañé, 1856).

MACROCEPHALUS MACILENTUS Westwood. — Type: Colombie (Lebas, 1830).

MACROCEPHALUS MANICATUS Fabricius. — Type: Caroline (coll. Bosc).

MACROCEPHALUS NOTATUS Westwood. — Colombie (Lebas, 1830); Mexique (Sallé, 1856).

MACROCEPHALUS PREHENSILIS Fabricius. — Type : Caroline (coll. Bosc).

MACROCEPHALUS TUBEROSUS Westwood. — Ouest de la capitainerie des Mines ; Rio-Janeiro, Paraguay (coll. G. Fallou).

MACROCEPHALUS WESTWOODI Guérin. — Type : Cuba (coll. Guérin-Ménéville).

OXYTHYREUS CYLINDRICORNIS Westwood. — Type : Patrie inconnue.

PHYMATA ACUTANGULA Guérin. — Colombie (Lebas, 1830); Brésil (coll. G. Fallou); Darien, Venezuela (F. Geay, 1896).

PHYMATA ARMATA Handlirsch (*loc. cit.*, p. 174). — Type : Matto-Grosso (de Castelnau, 1847); capitainerie des Mines.

PHYMATA CRASSIPES Fabricius. — Naples (Costa, 1855); Paris, Alger (coll. Guérin-Ménéville); Saint-Tropez (Var), Sarepta (coll. G. Fallou); Fontainebleau (S.-et-M.) (Finot, 1896); Viriville (Isère) (J. Martin, 1896).

PHYMATA EROSA Lin. subs. CARNEIPES Mayr. — Tapias (Colombie) (Steinheil, 1874); Rio-Janeiro (de Castelnau, 1847).

PHYMATA subs. CHILENSIS Handlirsch. — Santa-Rosa, Coquimbo (Chili) (Gay, 1843, 1845).

PHYMATA subs. CINNAMOMEA Handlirsch. — Matto-Grosso (de Castelnau, 1847).

PHYMATA subs. COMMUNIS Handlirsch. — Santa-Cruz de la Sierra (d'Orbigny, 1834); Brésil (Gaudichaud, 1833, et coll. G. Fallou); Matto-Grosso (de Castelnau, 1847).

PHYMATA subs. FASCIATA Gray. — Caroline : Zimmerman (coll. Bosc, coll. G. Fallou); Savannah (Harper, 1843); Nouvelle-Orléans (Laporte, 1834, coll. Guérin et G. Fallou); Mexique (A. Sallé, 1856, Giesbrecht, 1844, et coll. G. Fallou).

PHYMATA subs. GRANULOSA Handlirsch. — Mexique (A. Sallé, 1856, et coll. G. Fallou).

PHYMATA subs. PARVA Handlirsch. — Llanos de Venezuela (F. Geay, 1896).

PHYMATA subs. PARVICEPS Handlirsch. — Colombie, 1840; Cayenne (coll. G. Fallou).

PHYMATA EROSA Lin. subs. PENNSYLVANICA Handlirsch. — New-York (Harper, 1841); États-Unis (Mulsant, 1849); Boston (coll. G. Fallou).

PHYMATA subs. PRAESTANS Handlirsch. — Ouest de la capitainerie des Mines; province de Corrientes (d'Orbigny, 1834).

PHYMATA FORTIFICATA Herrich-Schaeffer. — Santa-Cruz de la Sierra (d'Orbigny, 1834); capitainerie des Mines (Brésil); Minas Geraes à Goyaz (de Castelnau, 1847); Cuba, Cayenne (coll. G. Fallou).

PHYMATA INTEGRATA Westwood. — Type : Patrie inconnue.

PHYMATA LACINIATA Handlirsch (*loc. cit.*, p. 158). — Type : San-Carlos (Colombie) (Steinheil, 1874).

PHYMATA MACULIPENNIS Handlirsch (*loc. cit.*, p. 158). — Type Brésil (coll. G. Fallou).

PHYMATA MONSTROSA Fabricius. — Montpellier (Hérault) (Chabrier, 1834, coll. Guérin-Méneville); Hyères (Var) (Finot, 1896); Alger (H. Lucas, 1849); Tanger (Favier, 1857 et 1859); Tlemcen (coll. G. Fallou).

PHYMATA RETICULATA Handlirsch. (*loc. cit.*, p. 152). — Type : Bogota (Lœvy, 1850).

PHYMATA SCABROSA Handlirsch (*loc. cit.*, p. 177). — Type : Brésil (coll. G. Fallou); Llanos du Venezuela (F. Geay, 1896).

ARADIDES NOUVEAUX,

PAR E. BERGROTH.

Cinyphus subtruncatus n. sp.

Subtriangularis, niger vel fusco-niger, inæqualiter concoloriter adpresse squamulosus, rostro et tibiis interdum obscure luteis. Caput latitudine evidenter longius, processu apicali medium articuli primi antennarum attingente vel paulum superante, apice plus minusve profunde inciso, spinis antenniferis levissime divaricatis, parte postoculari subrectangulata, antennis capite fere duplo longioribus, articulo primo piloso, secundo primo sat multo brevior, tertio primo paulo brevior, quarto secundo paulo brevior. Pronotum medio capite paulo brevius, lobo antico e basi apicem versus leviter dilatato, angulis apicalibus nonnihil prominulis, plerumque bifidis, lobo postico antico sat multo latiore. Hemelytra (♂) basim segmenti sexti dorsalis superantia, corio scutello multo longiore, margine apicali intus sinuato, membrana fusco-cinerea, venis nigris. Abdomen et basi sua fere usque ad apicem segmenti quinti dilatatum, margine laterali inter apicem segmenti secundi et medium segmenti quinti late leviter sinuato, angulis apicalibus segmentorum 1-4 prominulis, segmento sexto late subtruncato, margine ejus libero fere in medio lobulo parvo instructo, ventre punctulato, segmento secundo genitali maris superne intra marginem apicalem impresso. Long. ♂ 10 mm.

C. emarginato Stål structura pronoti similis, sed structura abdominis divergens.

Venezuela (Musée de Vienne). Au Musée de Paris se trouve une larve, qui paraît appartenir à cette espèce.